

## BOLETÍN DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

Nº 4  
8-07-2020

### FENOLOGIA

El cultivo se encuentra entre plántulas con 4-5 hojas y ahijado.

### PLAGAS

- **Aves:** Se observan daños causados por moritos, cigüeñuelas, cigüeñas, patos y daños más severos por el calamón común (gallo azul), con corte de plantas, provocando la replanta de las zonas afectadas.
- **Pulgón:** presencia va en aumento en el cultivo, tanto en variedades de grano largo como de grano redondo, realizándose tratamientos al superar umbrales en un 11% de la superficie.
- **Pudenta:** presencia en grama, rabo gato y otras adventicias, que están favoreciendo su entrada y presencia en el cultivo.

### MALAS HIERBAS

- **Echinocloa:** Continúan los tratamientos, alcanzando el 35% de la superficie tratada.
- **Arroz Salvaje:** las aplicaciones en variedades Clearfield alcanzan el 1,5% de la superficie.
- **Junquillo:** han comenzado los tratamientos, habiéndose realizado un 11% de la superficie.

### CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Elevadas temperaturas al principio de semana seguido de una leve caída de las temperaturas que favorecen el buen desarrollo del cultivo.

### OBSERVACIONES

Se generaliza la labor de replanta.

Siguen los daños de sal en finales de riego.

### RECORDATORIO DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS EN PRODUCCIÓN INTEGRADA

- **Gusano Rojo y Algas:** Bajar los niveles de la lámina de agua.
- Se recuerda que la comunicación de aplicación por medios aéreos debe realizarse con una semana de antelación.
- No podrán realizarse aplicaciones de herbicidas mediante pulverización los domingos.
- Inicio de la escarda manual.
- Se recomienda la eliminación de “rabo de gato” de las parcelas para prevenir la entrada de prudenta al cultivo.
- **Para mayor información consulte a su técnico.**

Fdo: Equipo Técnico